

Checklista för Grasmaster med pneumatic insådd

Kolla skicket på vallen: Gleshet, luckor, ogräs, moss, fjolårspö, isbränna, snömjöl, plantrester, tramp- körskador, gödsel- sorkhögar, utgångna vallväxtarter?

A: Bra skick

1-årig vall och årligt underhåll

Gödsling

Efter 2-5 dagar, när bestockningsfasen börjar:

1 Bearbeta m Grasmaster så att gödseln myllas ner samtidigt som bestockningen stimuleras. Grasmaster syresätter jorden, gynnar mineraliseringen och ökar effekten av gödseln samtidigt som sork- och gödselhögar jämnas och sprids ut. Parasit trycket reduceras också eftersom äggen härigenom utsätts för ljus, luft och torka vilket minskar spridningen till djuren.

Vill man förekomma risken för nytt ogräsinslag i vallen bör man samtidigt så in rajgräs o hundäxing. Dessa ater bestockar sig snabbt o hämmar därmed ogräsetablering. Ett tätt gräsbestånd ger hög avkastning med bra kvalitet o är säkraste skyddet mot att ogräs etablerar sig i vallen.

Är vid denna tidpunkt markfukten god kan man lämpligen samtidigt göra hjälpsådd av utgångna långsamt-växande arter (tex. Vitklöver). Finns det risk för ihållande torka bör man dock avvakta med denna hjälpsådd.

B: Normalskick

2 – 4 årig m ca 30% luckor o ogräs

Gödsling

Efter 2-5 dagar, när bestockningsfasen börjar:

1 Bearbeta m Grasmaster så att gödseln myllas ner samtidigt som bestockningen stimuleras. Grasmaster syresätter jorden, gynnar mineraliseringen och ökar effekten av gödseln samtidigt som sork- och gödselhögar jämnas och sprids ut. Parasit trycket reduceras också eftersom äggen härigenom utsätts för ljus, luft och torka vilket minskar spridningen till djuren.

Vill man förekomma risken för nytt ogräsinslag i vallen bör man samtidigt så in rajgräs o hundäxing. Dessa arter bestockar sig snabbt o hämmar därmed ogräsetablering. Ett tätt gräsbestånd ger hög avkastning med bra kvalitet o är säkraste skyddet mot att ogräs etablerar sig i vallen

Är vid denna tidpunkt markfukten god kan man lämpligen samtidigt göra hjälpsådd av utgångna långsamt-växande arter (tex. Vitklöver). Finns det risk för ihållande torka bör man dock avvakta med denna hjälpsådd.

2 Eftersådd av utgångna arter görs direkt efter skörd gärna på sensommaren när markfukten är säker till följd av regn /dagg och effekten av vårgödslingen avtagit. Vid denna tidpunkt är den gamla vallens tillväxt långsam o det finns ljus o fukt så att småfröiga sorter som inte tål beskuggning o uttorkning skall kunna etablera sig bra. Samtidigt erhålls en välgörande upprepning av bearbetning 1 d.v.s. : ogräsrivning, stimulering av bestockningen, syresättning, mineralisering, myllning, utjämning och förbättring av markstrukturen.

C: Dåligt skick

5 årig vall m max 50% luckor o ogräs

1 Förbearbetning med Grasmaster (OBS! skall ske när marken är torr) För att uppnå följande effekter: Uppluckring av jordskorpan o gräsvålen. Kapillärkraften bryts vilket minskar jordens avdunstning. Upprivning av ogräs, moss o förna. Stimulering av kvarvarande gräsets bestockning. Maskinens crossboard utjämnar större jordinslag, plogtiltor, isbränna, kör, trampskador, gödsel-, sorkhögar och lämnar en jämn såbbädd. Ökad syresättning o mineralisering av jorden. Förbättrad markstruktur.

Gödsling

2 Efter 2-5 dagar, när bestockningsfasen börjar: Bearbeta m Grasmaster en andra gång så att gödseln myllas ner samtidigt som bestockningen stimuleras ånyo . Grasmaster syresätter jorden, gynnar mineraliseringen och ökar effekten av gödseln samtidigt som sork- och gödselhögar jämnas och sprids ut. Parasit trycket reduceras också eftersom äggen härigenom utsätts för ljus, luft och torka vilket minskar spridningen till djuren. Samtidigt görs insådd med rajgräs o hundäxing. Dessa arter bestockar sig snabbt o hämmar därmed ogräsets etablering. Ett tätt gräsbestånd ger hög avkastning med bra kvalitet o är säkraste skyddet mot att ogräs etablerar sig i vallen.

Är vid denna tidpunkt markfukten god kan man lämpligen samtidigt göra hjälpsådd av utgångna långsamt-växande arter (tex. Vitklöver). Finns det risk för ihållande torka bör man dock avvakta med denna hjälpsådd.

3 Eftersådd av utgångna arter görs direkt efter skörd gärna på sensommaren när markfukten är säker till följd av regn /dagg och effekten av vårgödslingen avtagit. Vid denna tidpunkt är den gamla vallens tillväxt långsam o det finns ljus o fukt så att småfröiga sorter som inte tål beskuggning o uttorkning skall kunna etablera sig bra.

Checklista för Grasmaster med pneumatic insådd

Checklista för Grasmaster med pneumatic insådd

Checklista för Grasmaster med pneumatic insådd
